

### Листівка-вкладка

#### Назва ветеринарного препарату

Пулвак МагніПлекс – вакцина жива ліофілізована для профілактики інфекційної бурсальної хвороби птиці з розчинником.

#### Склад

Кожна доза (0,2 мл) містить:

##### Активні (діючі) речовини:

вірус бурсальної хвороби птиці, штам V877

$\geq 10^{1,3}$  EID<sub>50</sub>\*

антитіла до бурсальної хвороби

$\geq 20$  одиниць

##### Допоміжні речовини:

Гентаміцин (консервант)

0,085 г/мл

\*Стабілізатор

0,14 мл

сахароза (Р.А.)

62,5 г;

альбумін гідролізат

62,5 г;

монокалій Л-глутамат

1,0 г;

калій монофосфат основний ангідрид (EP)

1,6 г;

вода для ін'єкцій

до 1000 мл.

\* - мінімальний титр на кінець терміну придатності

Розчинник Про-Целл:

динатрію ЕДТА, дікалійфосфат безводний, комерційна сахароза, NZ амін AS, фенол червоний, вода.

#### Фармацевтична форма

Ліофілізат та розчинник.

#### Імунобіологічні властивості

Після застосування вакцини в яйце імунітет формується у віці 14 діб і триває до 56 добового віку птаха.

При вакцинації одноденних курчат імунітет формується на 21 добу життя і триває до 56 діб.

#### Вид тварин

Кури.

#### Показання до застосування

Для вакцинації здорових одноденних курчат та ембріонів в яйце для попередження бурсальної хвороби птиці.

#### Протипоказання

Не застосовувати хворій, ослабленій та з ознаками ураження паразитами птиці.

#### Особливі застереження при використанні

Не має.

#### Застосування в період несучості

Вакцину не рекомендовано до застосування у період несучості.

#### Взаємодія з іншими засобами

Не відома.

#### Спосіб застосування та дози

Введення в яйце (*in ovo*) для 18-19 денним курячим ембріонам або підшкірно одноденним курчатам.

Спосіб застосування:

1. Розводити тільки ті флакони із вакциною, що будуть використані.
2. Використовувати 100 мл розріджувача Про-Целл (Pro-cell) на кожні 2000 доз вакцини та 400 мл розріджувача на кожні 8000 доз вакцини для введення у яйце на 18-19 дні ембріонального розвитку.

3. Використовувати 400 мл розріджувача Про-Целл (Pro-cell) на кожні 2000 доз вакцини та 1600 мл розріджувача на кожні 8000 доз вакцини для підшкірного введення одноденним курчатам.
4. Перенести достатню кількість розріджувача у флакон із ліофілізованою вакциною. Закрити флакон із вакциною та частиною розріджувача гумовим корком й сильно струснути до утворення суспензії.
5. Перенести отриману вірусну суспензію у флакон із розріджувачем. Закрити гумовим корком і знову добре перемішати.
6. Переконатися, що весь вміст вакцини з флакончика був розчинений.
7. Використовувати вакцину одразу після розведення.

**Дозування:**

Одноденним курчатам підшкірно – 0,2 мл.

В яйце (*in ovo*) 18-19 денним курячим ембріонам – 0,05 мл.

**Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти) та побічна дія**

Не виявлено.

**Спеціальні застереження**

Не застосовувати людям.

Вакцину необхідно застосовувати тільки клінічно здоровій птиці.

Необхідно уникати стресу у птиці до, під час та після вакцинації.

Вводити повну дозу вакцини у кожне яйце та кожній птиці, не зменшувати дозу.

Не тримати птицю в місцях де можлива контамінація іншими збудниками.

Вакцинувати одночасно всю птицю, яка перебуває в одному приміщенні.

Використовувати вакцину в спеціально відведених для вакцинації місцях.

**Період виведення (каренції)**

М'ясо – нуль діб.

**Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі вводять засоби захисту тваринам**

Необхідно вимити та продезінфікувати руки до та після застосування вакцини.

**Термін придатності**

В оригінальній упаковці: 24 місяці.

Після відкриття та розведення: 1 година.

**Умови зберігання та транспортування**

Вакцина: зберігати в оригінальній невідкритій упаковці, в сухому темному місці не доступному дітям при температурі від +2°C до +8°C.

Не заморожувати.

Розчинник: зберігати в оригінальній невідкритій упаковці, в сухому темному місці не доступному дітям при температурі від +15°C до +25°C.

**Упакування**

Флакони з прозорого скла, що містять 2000 або 8000 доз, закриті гумовою пробкою та запечатані алюмінієвими обжимними ковпачками.

Вторинна упаковка – пластикові коробки по 10 флаконів.

Розчинник: пластикові контейнери, які містять 400 або 1200 мл розчинника.

**Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення**

Зоетіс Інк., 10 Сільван Вей, Парсіппані, Нью Джерсі 07054, США.

**Назва та місцезнаходження виробника**

Зоетіс Індастріа де Продутос Ветерінаріос Лтда, Руа Луіз Фернандо Родрігес, 1701 Кампінас, Сан Пауло, Бразилія.

**Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом**

Залишки невикористаного препарату та флакони знешкоджують відповідно до законодавства України.

Продовження додатку 2  
до реєстраційного посвідчення  
№ ВА-00844-02-17  
від 03.07.2017

**Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.