

**Аватек 150 Г**  
**(порошок для перорального застосування, гранульований)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Гранульований порошок рудо-червоного кольору.

**Склад**

100 г препарату містять діючу речовину:

лазалоциду натрію - 15 г.

Допоміжні речовини: кальцію лігносульфат, оксид заліза, кальцію сульфат дигідрат.

**Фармакологічні властивості**

**АТСvet QP51, антипротозойні ветеринарні препарати (QP51AH02, лазалоцид)**

**Фармакодинаміка**

Лазалоцид - натрію, подібно до інших кокцидіостатиків, міцно зв'язує катіони (головним чином Na і K) та ефективно транспортує їх крізь біологічні мембрани, і таким чином порушує нормальний цикл розвитку еймерій (спорозоїди, мерозоїди та першої генерації шизонти).

Ефективний проти таких видів еймерій: *Eimeria necatrix*, *E. acervulina*, *E. tenella*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. mivati*. Єдиний двовалентний поліефірний іоноформний кокцидіостатик для профілактики еймеріозів у курчат-бройлерів та ремонтного молодняку курей.

**Фармакокінетика**

Після перорального застосування системна абсорбція лазалоциду відбувається швидко й інтенсивно з широким розповсюдженням по тканинах.

Лазалоцид та його метаболіти швидко і майже повністю виводяться з фекаліями.

**Застосування**

Профілактика курей (бройлерів та ремонтного молодняку курей віком до 16 тижнів), індиків (віком до 12 тижнів) при ураженні їх еймеріями:

кури: *Eimeria necatrix*, *E. acervulina*, *E. tenella*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. mitis*, *E. praecox*, *E. mivati*;

індики: *Eimeria innocua*, *E. subrotunda*, *E. meleagridis*, *E. dispersa*, *E. gallopavonis*, *E. adenoides*.

**Дозування**

Аватек 150 Г застосовують з кормом щоденно протягом усього періоду вирощування:

курчата-бройлери та ремонтний молодняк курей (віком до 16 тижнів):

500-830 г препарату Аватек 150 Г (еквівалентно 75 – 125 г лазалоциду натрію) на 1 тонну комбікорму;

індики (віком до 12 тижнів):

600-830 г препарату Аватек 150 Г (еквівалентно 90-125 г лазалоциду натрію) на 1 тонну комбікорму.

Для забезпечення рівномірного перемішування з комбікормом розраховану кількість препарату Аватек 150 Г спочатку змішують із 10 та 100 кг комбікорму, потім отриману суміш ретельно перемішують із рештою (900 кг) комбікорму.

**Протипоказання**

Не застосовувати іншим видам птиці та ссавцям!

Препарат токсичний для коней, великої рогатої худоби та овець!

Не застосовувати курям-несучкам та іншій птиці під час несучості!

**Застереження**

Забій птиці на м'ясо дозволяють через 5 діб після останнього застосування препарату.

Клінічними ознаками передозування є зменшення споживання корму та зменшення приростів, а в деяких випадках пригнічення, опущені крила та ненормальна постава. При виникненні подібних ускладнень необхідно негайно виключити з корму Аватек 150 Г.

При роботі з препаратом слід користуватися індивідуальними засобами захисту (захисною маскою, гумовими рукавицями, захисним одягом, окулярами), уникати попадання препарату в

дихальні шляхи та травний канал, на відкриті ділянки тіла. При випадковому попаданні препарату в очі негайно промити їх проточною водою.

**Форма випуску**

Багатошарові паперові пакети по 20 кг.

**Зберігання**

У закритому упакованні, в сухому прохолодному, добре вентильованому приміщенні, при температурі від 0 до 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Термін придатності**

3 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

**Власник реєстраційного посвідчення**

Зоетіс Інк. (Сполучені Штати Америки)  
100 Кампус Драйв, Флорхем-Парк,  
Нью-Джерсі 07932

Zoetis Inc. (USA)  
100 Campus drive, Florham Park,  
New Jersey 07932

**Виробник готового продукту**

Зоетіс Медолла Мануфекчурінг С.р.л.  
(Італія)  
Via Rubadello 6, 41036 Медолла (МО)

Zoetis Medolla Manufacturing S.r.l.  
(Italy)  
Via Rubadello 6, 41036 Medolla (MO)