

Додаток 2  
до реєстраційного посвідчення  
№ ВА-00794-02-16  
від 06.04.2016

### Листівка-вкладка

#### Назва ветеринарного препарату

Пулвак БурсаПлекс – вакцина жива для профілактики інфекційної бурсальної хвороби птиці.

#### Склад

Кожна доза (0,2 мл) містить:

##### Активні (діючі) речовини:

вірус бурсальної хвороби птиці, штам 2512  $\geq 100 \text{ EID}_{50}$   
антитіла до бурсальної хвороби  $\geq 24$  одиниці

##### Допоміжні речовини:

Гентаміцин (консервант)  $\leq 30$  мкг/мл  
\*Стабілізатор 0,14 мл  
сахароза (Р.А.) 62,5 г;  
альбумін гідролізат 62,5 г;  
монокалійЛ-глутамат 1,0 г;  
калій монофосфат основний ангідрид (EP) 1,6 г;  
вода для ін'єкцій до 1000 мл.

#### Фармацевтична форма

Ліофілізат.

#### Імунобіологічні властивості

Після застосування вакцини за рекомендованою схемою через 10 діб формується активний імунітет проти інфекційної бурсальної хвороби, який триває протягом 3 місяців.

#### Вид тварин

Кури.

#### Показання до застосування

Для вакцинації здорових курей та ембріонів в яйце для попередження бурсальної хвороби птиці.

#### Протипоказання

Не застосовувати хворій та ослабленій птиці.

#### Особливі застереження при використанні

Не має.

#### Застосування в період несучості

Вакцину не рекомендовано до застосування у період несучості.

#### Взаємодія з іншими засобами

Не відома.

#### Спосіб застосування та дози


Застосовувати підшкірно для курей з добового віку або для вакцинації в яйце для 18-19 денних курячих ембріонів за допомогою спеціальних ін'єкційних систем (наприклад, EMBREX® INOVOJECT®). Ця вакцина може бути використана у комбінації з вакциною для профілактики хвороби Марека (жива вакцина, серотип 2 та 3, виробник Зоетіс Інк.) для вакцинації курячих ембріонів в яйце або підшкірно одноденним курчатам.

##### 1. Підшкірна ін'єкція курчатам:

- розчинити 1000 доз вакцини у 200 мл розчинника (можна використати розчинник виробництва компанії Зоетіс Інк. для вакцини для профілактики хвороби Марека або стерильну воду);
- ввести дозу у кількості 0,2 мл розчиненої вакцини кожному курчаті.

##### 2. Вакцинація в яйце 18-19 денних курячих ембріонів:

- розчинити 4000 доз вакцини у 200 мл розчинника (можна використати розчинник виробництва компанії Зоетіс Інк. для вакцини для профілактики хвороби Марека або стерильну воду);
- застосувати ін'єктор згідно інструкції щодо його використання;



Продовження додатку 2  
до реєстраційного посвідчення  
№ ВА-00794-02-16  
від 06.04.2016

- ввести дозу у кількості 0,05 мл у кожне яйце з курячим ембріоном.

**Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти) та побічна дія**  
Не виявлено.

**Спеціальні застереження**

Не застосовувати людям.

Вакцину необхідно застосовувати тільки клінічно здоровій птиці.

Необхідно уникати стресу у птиці до, під час та після вакцинації.

Вводити повну дозу вакцини у кожне яйце та кожній птиці.

Не тримати птицю в місцях де можлива контамінація іншими збудниками.

Вакцинувати одночасно всю птицю, яка перебуває в одному приміщенні.

Використовувати вакцину в спеціально відведених для вакцинації місцях.

Застосовувати тільки в стаді з історією інфекційної бурсальної хвороби.

**Період виведення (каренції)**

М'ясо - 21 доба.

**Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі вводять засоби захисту тваринам**

Необхідно вимити та продезінфікувати руки до та після застосування вакцини.

**Термін придатності**

В оригінальній упаковці: 36 місяців.

Після відкриття та розведення: 1 година.

**Умови зберігання та транспортування**

Зберігати в оригінальній невідкритій упаковці, в сухому темному місці при температурі від +2°C до +7°C. Не заморожувати.

**Упакування**

Флакони з прозорого скла, що містять, 1000, 2000 або 8000 доз, закриті гумовою пробкою та алюмінієвою кришкою. Вторинна упаковка – пластикові коробки по 25 або 15 флаконів.

**Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення**

Зоетіс Інк., 100 Кампус Драйв, Флорхем Парк, Нью Джерсі 07932, США.

**Назва та місцезнаходження виробника**

Зоетіс Інк., 2000 Рокфорд Род, Чарльз Сіті, Айова 50616, США.

**Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом**

Залишки невикористаного препарату та флакони знешкоджують відповідно до законодавства України.

**Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.