

Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00625-02-13
від 26.12.2014

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Пулвак ІВ QX – вакцина жива проти інфекційного бронхіту птиці.

Склад

Кожна доза містить:

Активні (діючі) речовини:

Живий атенуйований вірус інфекційного бронхіту птиці, штам L1148 $10^{3,0} - 10^{5,0}$ EID₅₀

Допоміжні речовини:

Стабілізатор:

Д-маннітол 50,0 мг

Желатин 70,7 мг

Інозитол 50,0 мг

Пептон 65,0 мг

Вода для ін'єкцій скільки потрібно до 1,0 мл

Вакцина містить гентаміцин в якості консерванту.

Фармацевтична форма

Ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

ATC vet code: QI01AD07

Препарат застосовують для активної імунізації птиці проти пташиного вірусу інфекційного бронхіту курей, викликаного QX- подібними варіантами збудника.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Для активної імунізації курчат з метою зменшення респіраторних ознак інфекційного бронхіту птиці викликаних QX - подібними варіантами збудника.

Утворення імунітету: через 3 тижні після вакцинації.

Тривалість імунітету: 63 дні після вакцинації.

Протипоказання

Не використовувати куркам-несучкам під час яйцекладки.

Не вакцинувати майбутніх несучок та курчат для батьківського стада до 1 тижневого віку.

Застереження при застосуванні

Вакцинувати тільки клінічно здорових тварин. Під час вакцинації вакцинованих курчат потрібно утримувати окремо від не вакцинованих що мінімум 2 тижні. Материнські антитіла можуть сприяти утворенню імунітету після вакцинації. Не вакцинувати в інкубаторах.

Існує невеликий діапазон між ефективною дозою вакцинації і не ефективною дозою, тому потрібно впевнитися, що птиця отримує потрібну ефективну дозу вакцини.

Взаємодія з іншими засобами

Немає інформації про безпеку та ефективність цієї вакцини при використанні одночасно з іншими будь-якими ветеринарними лікарськими засобами, тому рішення приймається на індивідуальній основі.


Особливі вказівки при застосуванні в період несучості

Не використовувати під час несучості та за 4 тижні до початку періоду яйцекладки.

Спосіб застосування та дози

Бройлери: одна доза вакцини курчатам від першого дня життя, аерозольна вакцинація.

Майбутні несучки та курчата для батьківського стада: одна доза вакцини з 7-ми денного віку за допомогою аерозольної вакцинації.



Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00625-02-13
від 26.12.2014

Пулвак ІВ QX може бути використаний для більшості типів обладнання для розпилення. Застосовують обладнання з крупнокропельним розпиленням (краплі від 80 до 160 мкм). Відстань від розпилювача до голови птиці повинно бути приблизно 50 см. Використовувати від 0,15 до 0,5 літрів води на 1000 птахів в залежності від типу обладнання, яке буде використовуватись.

Підготовка вакцини до застосування. Зняти алюмінієву обгортку з флакона вакцини. Для розчинення вмісту флакона вакцини зняти гумову пробку і помістити в літровий мірний стакан (інший посуд) з чистою холодною водою. Потім заповнити наполовину водою флакон з вакцини, закрити пробкою, добре струсити для розчинення залишків вакцини і додати до загального об'єму. Концентрат вакцини повинен бути доданий до води резервуару оприскувача і ретельно перемішаний.

Налаштувати обладнання – одна підготовлена доза вакцини на певну кількість птиці.

Передозування та побічні ефекти

При десятикратному передозуванні спостерігаються ознаки уражень нирок (блідість, мікроскопічні пошкодження).

Після вакцинації небажані побічні ефекти не спостерігаються.

Період виведення (каренції)

Нуль діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВП

Всі процедури пов'язані з підготовкою вакцини, налаштування обладнання та проведення вакцинації потрібно виконувати у спецодезії.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Утилізація відходів вакцини кип'ятінням, спалюванням або занурюванням у відповідний дезінфікуючий засіб призначений для використання компетентними органами України.

Термін придатності

Термін придатності в оригінальній упаковці: 18 місяців.

Термін зберігання після відкриття та розведення: 2 години.

Умови зберігання і транспортування

Зберігати та транспортувати за температури +2⁰С – +8⁰С.

Не заморожувати. Березти від світла.

Упаковка

Скляні пляшечки об'ємом по 3 мл з хлорбутиловими гумовими пробками обгорнутих зверху алюмінієвими кришками. Коробки по 10x2000 доз, 10x5000 доз, 10x10000 доз.

Правила відпуску

Без рецепта

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Зоетіс Інк., 100 Кампус Драйв, Флорхем Парк, Нью Джерсі 07932, США.

Назва та місцезнаходження виробника

Зоетіс Менюфактурінг енд Рісерч Іспанія еС. еЛ., 17813 Валь де Біанья (Жирона), Іспанія.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.