

Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00329-02-11
від 06.04.2016

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Пулвак ND La Sota, Poulvac ND La Sota – вакцина жива ліофілізована проти ньюкаслської хвороби птиці.

Склад

Кожна доза (0,03 мл) містить:

Активнодіюча речовина:

вірус ньюкаслської хвороби, штам La Sota $\geq 10^{6,0} \text{EID}_{50}$.

Допоміжні речовини:

фарматон $\leq 0,0125$ мг;

бактопептон $\leq 0,1125$ мг;

сахароза $\leq 0,1250$ мг;

N-Z амін тип YТ $\leq 0,0625$ мг;

натрієва сіль глютамінової кислоти $\leq 0,0125$ мг.

Фармацевтична форма

Ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

Через 3 тижні після застосування вакцини у курей та індиків формується активний імунітет проти ньюкаслської хвороби.

Вид тварин

Кури та індики.

Показання до застосування

Для активної імунізації курей та індиків проти ньюкаслської хвороби.

Протипоказання

Не застосовувати хворій птиці.

Застереження при застосуванні

Необхідно уникати стресу птиці в період вакцинації.

Взаємодія з іншими засобами

Вакцину не слід застосовувати впродовж 14 діб до та після застосування будь-якої іншої живої вакцини.

Особливі вказівки при застосуванні в період несучості

Не застосовувати птиці в період несучості.

Спосіб застосування та дози

Для застосування методом випоювання, аерозольно та інтраокулярно/інтраназально птиці з добового віку.

Вакцина має бути розчинена у вказаній кількості води.


Загальна інформація: Використовуйте прохолодну свіжу воду, що не містить хлору та іонів металів. Перед розчиненням вакцини рекомендується додати у воду сухого знежиреного молока (4 г на 1 літр води) або відповідну кількість знежиреного молока. Флакони необхідно відкривати під водою та добре струсити.

1. Метод випоювання:

Система подачі води і труби мають бути чистими, без слідів дезінфікуючих засобів. Перед введенням розчину вакцини не напувати птицю близько 2 годин. В залежності від щільності посадки птиці під час напування необхідно від 20 до 40 мл води на одну птицю. Для вакцинації 1000 голів птиці 1 флакон на 1000 доз необхідно розчинити у 20-40 л води.

2. Аерозольний метод:

Використовуйте відповідний вакцинатор та розприскуйте вакцину на птицю з близької відстані. Один флакон вакцини, що містить 1000 доз, необхідно розчинити у 500 мл води. 500 мл води розраховано на 1000 голів птиці.



Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00329-02-11
від 06.04.2016

3. Інтраокулярний/ інтраназальний метод:

1000 доз вакцини розчинити у 1400 мл питної води. Вносити птиці вакцинний розчин по одній краплі в одне око, або одну ніздрю. Для зручності використовуйте піпетку з округлим отвором, щоб досягти найбільшого об'єму краплі.

Побічні ефекти

Не відомі.

Період виведення (каренції)

21 день.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВП

Мити руки дезінфікуючими засобами після використання вакцини. Необхідно одягати маску та захисні рукавички під час розприскування вакцини.

У разі випадкового введення людині необхідно негайно звернутись до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Залишки невикористаного препарату та флакони знешкоджують відповідно до законодавства України.

Термін придатності

30 місяців. Розчинену вакцину використати відразу.

Умови зберігання і транспортування

Сухе, темне місце за температури від 2 °С до 7 °С.

Упаковка

Скляні флакони по 1000, 2500, 5000 або 10000 доз.

Правила відпуску

За рецептом.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Зоетіс Інк., 100 Кампус Драйв, Флорхем Парк, Нью Джерсі 07932, США.

Назва та місцезнаходження виробників

Зоетіс Індастріа де Продутос Ветерінаріос Лтда, Руа Луіз Фернандо Родрігес, 1701 Кампінас, Сан Пауло, Бразилія.

Зоетіс Інк., 2000 Рокфорд Род, Чарльз Сіті, Айова 50616, США.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.