

**Робенц 66 Г**  
**(порошок мікрогранульований для перорального застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Мікрогранульований порошок для перорального застосування світло-коричневого кольору.

**Склад**

100 г препарату містять діючу речовину:

робенідину гідрохлорид – 6,6 г.

Допоміжні речовини – лігносульфат кальцію, дигідрат кальцію сульфат (гіпс).

**Фармакологічні властивості**

**АТСvet QP51, антипротозойні ветеринарні препарати (QP51AX13, робенідин)**

Діюча речовина препарату, робенідину гідрохлорид, кокцидіостатик, який діє на еймерії в стадії шизонта першої та другої генерації. Активний щодо еймерій: *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. maxima*.

Дослідження підтвердили низьку абсорбцію препарату у курчат (20-40%) із швидким проходженням по травному каналу. Основний шлях виведення – з фекаліями, що складає в середньому 60-65 % від загальної дози.

**Застосування**

Профілактика та лікування курчат-бройлерів та індиків при ураженні їх збудниками еймеріозів: *Eimeria acervulina*, *E. maxima*, *E. tenella*, *E. necatrix*, *E. brunetti*, *E. mivati*, *E. adenoides*, *E. meleagridis*, *E. gallopavonis*, *E. dispersa*.

**Дозування**

Робенц 66 Г згодують курчатам-бройлерам та індикам разом з кормом у дозі 450-545 г/тону корму (30-36 ppm робенідину гідрохлориду/кг). З профілактичною метою препарат згодують індикам з перших днів життя до 16 тижнів, курчатам-бройлерам з перших днів життя протягом усього періоду їх вирощування, вилучаючи з раціону за 5 днів до забою.

**Протипоказання**

Не застосовувати курям-несучкам та індикам під час несучості!

Не використовувати з кормовими антибіотиками!

**Застереження**

Забій птиці на м'ясо дозволяють через 5 днів після останнього застосування препарату. У випадку забою раніше встановленого терміну м'ясо використовують для годівлі м'ясоїдних тварин або виготовлення м'ясо-кісткового борошна.

При роботі з препаратом рекомендують використовувати захисний одяг, респіратор, рукавиці та щільно прилягаючі захисні окуляри. При попаданні препарату в очі промити їх великою кількістю води протягом 15 хв.

**Форма випуску**

Багатошарові паперові мішки по 20 кг.

**Зберігання**

Зберігати в сухому місці при температурі від 15 до 25 °С.

**Термін придатності**

3 роки.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

**Власник реєстраційного посвідчення**

Зоетіс Інк. (Сполучені Штати Америки)  
100 Кампус Драйв, Флорхем Парк,  
Нью Джерсі 07932

Zoetis Inc. (USA)  
100 Campus drive, Florham Park,  
New Jersey 07932

**Виробник готового продукту**  
Зоетіс Мендолла Мануфактурінг, С.Р.Л.  
(Італія)  
Віа Рубаделло 6, 41036 Медолла

Zoetis Medolla Manufacturing S.R.L.,  
Via Rubadello 6, 41036 Medolla (MO),  
Italy