

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Суваксин PCV 2 MetaStim[®] – вакцина інактивована для профілактики цирковірозу свиней типу 2.

Склад

Кожна доза (2 мл) містить:

Активна (діюча) речовина:

cPCV1-2 інактивована суспензія

- $\geq 1,3$ RP/дозу при випуску

$\geq 1,0$ RP/дозу на кінець терміну придатності

Допоміжні речовини:

Ад'ювант:

SP-Oil 10% ± 1 % кінцевої концентрації

Наповнювачі:

тімеросал (10 % розчин), PBS розчин,

Гентаміцин додається в якості консерванту.

Фармацевтична форма

Емульсія.

Імунобіологічні властивості

Через 3 тижні після застосування вакцини у поросят утворюється активний імунітет проти вірусу PCV-2, який триває 23 тижні.

Вид тварин

Свині.

Показання до застосування

Для активної імунізації поросят віком 3 тижні та старших з метою профілактики віремії, лімфоїдного виснаження та запобігання ураженню лімфоїдної тканини свиней цирковірусом 2-го типу, а також зниження виділення у навколишнє середовище вірусу PCV-2.

Протипоказання

Не рекомендовано застосовувати вагітним або лактуючим свиноматкам.

Препарат можна застосовувати тільки для імунізації здорових тварин. Утворення імунітету не може бути гарантовано у тварин:

- в інкубаційному періоді інфекційних захворювань,
- у стані виснаження,
- уражених гельмінтами,
- у стресовому стані, викликаному транспортуванням, впливом зовнішнього середовища, або у іншому імуносупресивному стані.

Напружений імунітет може бути не вироблений також у випадках, коли вакцина була застосована не відповідно до настанови.

Застереження при застосуванні

Застосовуючи вакцину потрібно використовувати стерильні шприці та голки. Так само як і при застосуванні інших вакцин, може виникати реакція у вигляді анафілаксії. У цьому випадку тварині негайно вводять епінефрин і надалі проводять адекватну симптоматичну терапію.

Взаємодія з іншими засобами

Не має ніякої інформації про сумісність цієї вакцини з будь-якими іншими імунобіологічними та фармацевтичними препаратами. Таким чином не рекомендоване застосування будь-яких інших вакцин за 14 днів до та після вакцинації даним препаратом.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Не застосовувати вагітним або лактуючим свиноматкам.

Спосіб застосування та дози

Перед застосуванням флакон добре струсити до утворення однорідної емульсії.

Асептично ввести 2 мл вакцини внутрішньом'язово поросятим віком 3 тижні та старше або ввести 1 мл вакцини внутрішньом'язово поросятим у віці 3 тижні з наступним введенням у дозі 1 мл через 2 тижні.

Побічні ефекти

Іноді введення вакцини може викликати реакцію у вигляді анафілаксії. У цьому випадку вводять епінефрин і надалі проводять адекватну симптоматичну терапію.

Період виведення (каренції)

21 день.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВІП

У разі випадкового введення людині необхідно негайно звернутись до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Залишки невикористаного препарату та флакони знешкоджують відповідно до вимог місцевого законодавства.

Термін придатності

24 місяці. Вміст флакону необхідно використати одразу після відкриття.

Умови зберігання і транспортування

Сухе, темне місце при температурі від 2 °С до 7 °С. Не заморозувати!

Упаковка

Скляні або пластикові флакони високої щільності, що містять 10, 50, 125, 250 або 500 доз.

Правила відпуску

Без рецепту.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Зоетіс Інк., 10 Сільван Вей, Парсіппані, Нью Джерсі 07054, США.

Назва та місцезнаходження виробника

Зоетіс Інк., 2000 Рокфорд Роад, Чарльз Сіті, Айова 50616, США.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.