

Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00575-02-13
від 05.10.2015

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Ларинго-Вак / Laryngo-Vac – вакцина жива модифікована проти інфекційного ларинготрахеїту птиці з розчинником.

Склад

Кожна доза (0,03 мл) містить:

Активні (діючі) речовини:

Ембріональну рідину та навколоплідні оболонки SPF курей, інфіковані атенуйованим вірусом ІЛТ (штам "Salsbury 146") $\geq 10^{3,2}$ EID₅₀

Допоміжні речовини:

Стабілізатор А+В 0,0165 мл

Також до складу вакцини входить гентаміцин в якості бактеріостатичного засобу.

Склад «Стерильного розчинника 28»:

K₂HPO₄ · 3H₂O 2,23 г

KH₂PO₄ 0,2 г

Барвник зелений, FD&C № 3 0,1 г

Вода очищена q.s. 1,000 мл

3. Фармацевтична форма

Ліофілізована вакцина та розчинник.

Фармацевтична форма

Ліофілізована вакцина та розчинник.

Імунобіологічні властивості

Вакцина Ларинго-Вак призначена для профілактики інфекційного ларинготрахеїту птиці в неблагополучних по даному захворюванню племінних та товарних господарствах. Імунітет формується через 2 тижні після вакцинації та триває 6 місяців.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Для активної імунізації курей проти інфекційного ларинготрахеїту птиці

Протипоказання

Не застосовувати хворій птиці.

Застереження при застосуванні

Необхідно уникати стресу у курей до, під час та після вакцинації.

Вакцину необхідно ретельно струсити перед використанням.

Розчинену вакцину необхідно одразу ж використати.

Взаємодія з іншими засобами

Не має ніякої інформації про сумісність цієї вакцини з будь-якими іншими імунобіологічними та фармацевтичними препаратами. Таким чином безпечність та ефективність використання вакцини одночасно з будь-якими іншими ветеринарними препаратами не доведена.

Особливі вказівки при застосуванні в період несучості

Можливе застосування птиці в період несучості.

Спосіб застосування та дози

Вакцину застосовують за допомогою наступних методів: окулярний, випоювання, метод спрею.

Вакцинація окулярним методом рекомендується для курчат з 4 тижневого віку. Для цього методу використовують тільки флакони, які містять 1000 доз вакцини та «Стерильний розчинник 28».

1. Для підготовки вакцини до застосування з флаконів з вакциною та з розчинником знімають, дотримуючись правил асептики, алюмінієві ковпачки та гумові пробки.

2. Флакон з вакциною заповнюють до половини об'єму розчинником, закривають гумовою пробкою та ретельно струшують до повного розчинення препарату.
3. Вміст флакону виливають у флакон з розчинником, що лишився, закривають гумовою пробкою, ще раз ретельно струшують та замінюють пробку на дозатор.
4. За допомогою дозатора по 1 краплі (0,03 мл) препарат наносять на кон'юнктиву ока. Слід уникати розповсюдження вакцини за межі ока.

Випоювання вакцини з питною водою рекомендується для вакцинації курчат з 10–ти денного віку і старше. Ревакцинацію проводять в 16-20 тижнів.


1. Робочий розчин вакцини готують у чистих ємностях, які заповнюють водою в об'ємі, що складає 2/3 від необхідного для вакцинації та додають сухе молоко з розрахунку:

Кількість доз вакцини	Кількість сухого молока (г) для вакцинації курчат у віці, тижнів		Об'єм води (л), необхідний для вакцинації курчат у віці, тижнів	
	1,5-8	старше 8	1,5-8	старше 8
1000	35,5-71	71-142	9,5-19	19-38
5000	179-355	355-710	48-95	95-190

2. Сухе молоко ретельно перемішують до повного розчинення.
3. З флаконів з вакциною знімають ковпачки, гумові пробки та заповнюють до половини об'єму чистою, охолодженою, не хлорованою водою, закривають гумовими пробками та ретельно струшують. Після цього вміст флаконів переносять в ємність з водою та молоком, перемішують та доводять до потрібного об'єму.
4. Системи водозабезпечення перед імунізацією треба ретельно промити без застосування дезінфікуючих засобів та просушити.
5. Перед початком вакцинації птицю витримують без води протягом двох годин. При дуже спекотній погоді час витримки курчат без води скорочують.
6. Птицю вакцинують з розрахунку одна доза на голову. Треба забезпечити одночасний вільний доступ до вакцини не менше 2/3 птиці, що імунізують.
7. Напувалки з розведеною вакциною треба захистити від прямих сонячних променів.
8. За 24 години до вакцинації та протягом 24 годин після її завершення забороняється використовувати з водою лікарські засоби та дезінфектанти.
9. Забороняється подавати вакцину через обладнання, яке використовують для подачі лікарських засобів.

Спрей–метод рекомендується для вакцинації курчат з 10–ти денного віку та старше. Ревакцинацію проводять в 16-20 тижнів.

1. З флаконів з вакциною видаляють алюмінієві ковпачки, гумові пробки та заповнюють до половини об'єму холодною дистильованою водою, закривають гумовими пробками та ретельно струшують до повного розчинення препарату.
2. Після цього 1000 доз вакцини розчиняють в 100 мл, а 5000 доз вакцини – в 500 мл холодної, дистильованої води та ретельно перемішують.
3. Підготовленим розчином можна вакцинувати птицю з розрахунку 100 мл розведеної вакцини на 1000 голів птиці.
4. Вакцинацію проводять за допомогою спеціальних розпилювачів, які створюють монодисперсні часточки розміром 75-120 мікрон.
5. В пташнику відключають вентиляцію, зменшують інтенсивність освітлення, що заспокоює птицю та сприяє її скупченню. Через 20 хвилин після закінчення вакцинації вмикають систему вентиляції та поновлюють рівень освітлення.



Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00575-02-13
від 05.10.2015

Партії курчат, що підлягають щепленню, треба вакцинувати одночасно, дотримуючись заходів по нерозповсюдженню вакцинного вірусу на не вакциноване поголів'я.

Побічні ефекти

При застосуванні в продуктивний період можливе тимчасове зниження несучості.

Період виведення (каренції)

21 доба.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВП

У разі випадкового введення людині необхідно негайно звернутись до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Залишки невикористаного препарату та флакони знешкоджують відповідно до законодавства України.

Термін придатності

24 місяці. Вакцину необхідно використати відразу після відкриття.

Умови зберігання і транспортування

Сухе, темне місце за температури 2 °С - 7 °С в оригінальному, не відкритому контейнері.

Упаковка

Вакцина – скляні або пластикові флакони по 1000, 5000 та 10000 доз. Вторинне пакування – коробки по 10 флаконів.

Стерильний розчинник 28 – пластикові флакони, що містять 30 мл розчинника. Вторинне пакування – коробки по 10 флаконів.

Правила відпуску

За рецептом.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Зоетіс Інк., 100 Кампус Драйв, Флорхем Парк, Нью Джерсі 07932, США.

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності виробника

Зоетіс Інк., 2000 Рокфорд Род, Чарльз Сіті, Айова 50616, США.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламацій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.