

Додаток 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00373-02-11
від 10.10.2016

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Пулвак Бурса Ф (Пулвак Бурса Плюс), Poulvac Bursa F (Poulvac Bursa Plus) – вакцина жива ліофілізована проти інфекційної бурсальної хвороби птиці.

Склад

Кожна доза містить:

Активні (діючі) речовини:

суспензія, що містить вірус бурсальної хвороби птиці, штам V877 $\geq 10^{2.0}$ EID₅₀.

Допоміжні речовини:

розчин гентаміцину сульфату (консервант) $\leq 0,2$ МО;

розчин ністатину (консервант) $\leq 0,2$ МО;

сахароза/альбумін/фосфатний стабілізатор* до об'єму 1 дози.

*Стабілізатор (1 літр):

безводний гідроортофосфат натрію	1,250 г;
безводний дигідроортофосфат натрію	0,520 г;
сахароза (Р.А.)	74,600 г;
коров'ячий альбумін Фракція V	10,000 г;
3,2 % розчин соляної кислоти	0,500 мл;
демінералізована вода	до 1000 мл.

Фармацевтична форма

Ліофілізат.

Імунобіологічні властивості

Після застосування вакцини за рекомендованою схемою через 10 діб формується активний імунітет проти інфекційної бурсальної хвороби, який триває до 3 місяців.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Для вакцинації курчат проти інфекційної бурсальної хвороби, а також для вакцинації несучок і батьківських стад перед застосуванням інактивованої вакцини.

Протипоказання

Не застосовувати клінічно хворій та/ або зараженій паразитами птиці.

Застереження при застосуванні

Не має.

Взаємодія з іншими засобами

Не відома.

Особливі вказівки при застосуванні в період продуктивності

Вакцину не рекомендовано до застосування у період несучості.


Спосіб застосування та дози

Бройлери: застосовувати вакцину тоді, коли очікується зниження материнського імунітету настільки, що він не буде впливати на ефективність вакцинації. Це можна визначити за допомогою серологічного дослідження сироватки крові курчат.

Несучки: застосовувати у віці 10–17 діб і потім повторна вакцинація на 21–28 добу.

Батьківські стада: застосовувати у віці 10–17 діб і потім повторна вакцинація на 21–28 добу. Застосовувати втретє за 6 або більше тижнів перед застосуванням інактивованої вакцини проти бурсальної хвороби.

За умови високого або дуже мінливого материнського імунітету слід застосувати вакцину більш часто.



Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00373-02-11
від 10.10.2016

Приготування вакцини:

Вакцинувати тільки клінічно здорову птицю, краще зранку. Уникати стресу під час вакцинації. Припинити використання лікарських та дезінфікуючих засобів у питній воді за 48 годин до застосування вакцини та протягом 24 годин після вакцинації. Витримати звичайну питну воду протягом 1-2 годин перед вакцинацією, якщо температура навколишнього середовища не дуже висока. Для приготування вакцини використовувати тільки чисту не хлоровану воду без дезінфектантів, детергентів, важких металів.

Приготування розчинника:

Беручи за основу звичайне споживання води у стаді, розрахувати кількість води, яка споживається протягом 1-2 годин (з розрахунку 4-10 літрів води на 1000 курчат). Підготувати необхідну кількість води для використання в якості розчинника для вакцини, додаючи 2-4 г сухого молока на літр.

Регідратація ліофілізованої вакцини:

Упевнитись, що на кожну птицю використовується щонайменше одна доза вакцини. Зняти з флакона з вакциною кришку і пробку. Наполовину заповнити його підготовленим водним розчинником і збовтати трохи, поки вакцина повністю на розчиниться. Додати вакцину до залишку водного розчинника і ретельно перемішати. Промити флакон з вакциною у водному розчиннику. Використати весь вміст флакону відразу після відкриття.

Використання питної води

Використовувати сухі, чисті, неметалеві напувалки, на яких немає слідів дезінфектантів або детергентів. Забезпечити достатню кількість напувалок, щоб дві треті стада могли пити одночасно. Рівномірно розподілити вакцину в напувалках. Не ставити напувалки з вакциною під прямі сонячні промені. Поновити звичайне споживання води відразу після того, як буде спожито всю вакцину.

Побічні ефекти

Не відомі.

Період виведення (каренції)

21 доба.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВП

Необхідно мити та дезінфікувати руки до та після застосування вакцини.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Залишки невикористаного препарату та флакони знешкоджують відповідно до законодавства.

Термін придатності

24 місяці. Використайте весь вміст флакону вакцини одразу після відкриття.

Умови зберігання і транспортування

Вакцину слід зберігати в оригінальній, невідкритій упаковці в темному приміщенні при температурі від +2°C до +8°C. Не заморожувати.

Упаковка

Флакони з боросилікатного скла, що містять 500, 1000, 2000, 5000 або 10000 доз, закриті гумовою пробкою та алюмінієвою кришкою. Вторинна упаковка – пластикові коробки по 10 флаконів.

Правила відпуску

За рецептом.

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Зоетіс Інк., Кампус Драйв 100, Флорхем Парк, Нью Джерсі 07932, США.

Назва та місцезнаходження виробника

Зоетіс Індастріа де Продутос Ветерінаріос Лтда., Руа Луїз Фернандо Родрігес, 1701 Кампінас, Сан Пауло, Бразилія.

Зоетіс Інк., 2000 Рокфорд Род, Чарльз Сіті, Айова 50616, США.

Зоетіс Менюфакчурінг енд Рісерч Спеін, еСеЛ., 17813 Валь де Біанья (Жирона), Іспанія

Державний комітет ветеринарної медицини України
Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів
Ідентифікаційний код 19024865
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТУ

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-00373-02-11
від 10.10.2016

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.